




Regionalni centar
kompetentnosti
Mlinarska



PROMOTIVNI PROGRAM EDUKACIJE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

**„UČINI NEŠTO I
POMOZI!“**

PRVA POMOĆ

194

Hitna medicinska pomoć

Skup postupaka kojima pomažemo ozlijeđenoj ili naglo oboljeloj osobi do dolaska stručne medicinske pomoći.

Podrazumijeva zbrinjavanje tjelesnih ozljeda i stanja, ali i pružanje psihološke podrške emocionalno potresenim osobama koje su prisustvovale ili svjedočile traumatičnom događaju.

Intervencijama prve pomoći nastojimo sačuvati život, ublažiti patnju, spriječiti dalnje bolesti ili ozljede i ubrzati oporavak.



POSTUPAK PRVE POMOĆI KOD MANJE POVRŠINSKE RANE.



- Upotrijebiti zaštitne rukavice kako bi se izbjegao rizik od infekcije (osobna zaštita i zaštita unesrećene osobe).
- Ispirati je pod mlazom čiste hladne vode i prekriti je flasterom ili sterilnom gazom.



POSTUPAK PRVE POMOĆI KOD VEĆIH RANA



Osobu postaviti u ležeći položaj

Zaustaviti krvarenje izravnim pritiskom na ranu i kompresivnim zavojem (osim u slučaju kad se rana nalazi u području vrata, pazuha, prepona, kukova – tada samo izravan pritisak).

Prekriti ranu sterilnim materijalom ili čistom tkaninom i učvrstiti je zavojem ili trokutastom maramom.

Imobilizirati ozlijedeni dio tijela.

Pozvati hitnu medicinsku službu ili uputiti/otpratiti osobu u medicinsku ustanovu.





POSTUPAK PRVE POMOĆI KOD KRVARENJA IZ NOSA

Osobu postaviti u sjedeći položaj s glavom i gornjim dijelom tijela nagnutima prema naprijed

Laktove treba osloniti na koljena, a prstima pritisnuti mekani dio nosa.

Osobi napomenuti da diše na usta.

Stisak je potrebno popustiti nakon 10 do 15 min kako bismo provjerili je li krvarenje zaustavljen.

Ako je krvarenje zaustavljen - osobu upozoriti da ne ispuhuje nos.

Ako krvarenje nije zaustavljen - postupak se ponavlja do 30 minuta.

Ako krvarenje i dalje nije zaustavljen - zatražiti pomoć hitne medicinske službe



POSTUPAK PRVE POMOĆI KOD ISTEGNUĆA I UGANUĆA

- Osobi savjetovati da miruje i postaviti je u sjedeći ili ležeći položaj.
- Ozlijedeni dio tijela hladiti hladnim oblogom, time se smanjuju modrice, oticanje i bol.
- Hladan oblog na mjestu ozljede omotati vatom ili tkaninom i pričvrstiti ga kružnim zavojem sve do sljedećeg zgloba.
- Poduprijeti ozlijedeni dio tijela u povišenom položaju radi smanjenja modrica i oticanja.
- Provjeravati cirkulaciju izvan zavoja svakih 10 minuta i po potrebi olabaviti zavoj.
- Pozvati hitnu medicinsku pomoć ili uputiti u medicinsku ustanovu.



POSTUPAK PRVE POMOĆI KOD UBODA KUKACA (PČELA, OSA, STRŠLJEN)



- Umiriti unesrećenu osobu i pitati je o alergijama.
- Ako je vidljiv žalac, izvaditi ga postrance rubom kartice ili noktom.
- Podignuti dio tijela koji je uboden i postaviti hladan oblog na mjesto uboda.
- Savjetovati osobi da drži oblog na mjestu uboda najmanje 10 minuta.





pčela



stršljen



bumbar



osa

POSTUPAK PRVE POMOĆI KOD UBODA KUKACA (PČELA, OSA, STRŠLJEN) (1)

- Pozvati hitnu medicinsku službu ako je potrebno.
- U slučaju uboda u usta osobi dati da siše kockicu leda kako bi se spriječila oteklina.
- Ostatи uz osobу i pratiti stanje (razinu svijesti, disanje, puls) i znakove alergijske reakcije (crvena, otečena koža, svrbež, otežano disanje).



POSTUPAK PRVE POMOĆI KOD UBODA KRPELJA:

- Ukloniti krpelja što je prije moguće jer može prenositi zarazne bolesti i uzrokovati infekciju.
- Uhvatiti krpelja pincetom što bliže koži te nježno i ravnomjerno vući prema gore, ne svijati ni trzati pincetu i paziti da glava ne ostane u koži.
- Ne premazivati, natapati niti paliti krpelja- može ispustiti zaraženu slinu u kožu.
- Sačuvati krpelja radi identifikacije (staviti ga u hermetički zatvorenu plastičnu vrećicu).
- Pratiti stanje ubodene osobe i potražiti stručnu medicinsku pomoć ako je potrebno.



POSTUPAK PRVE POMOĆI KOD ŽIVOTINJSKOG (I LJUDSKOG) UGRIZA:

Rane nastale ugrizom često su duboke, tkiva su oštećena i velika je mogućnost nastanka infekcije.

Postoji mogućnost zaraze bjesnoćom i tetanusom

Ranu temeljito oprati sapunom i toplom tekućom vodom.

Ako je potrebno, zaustaviti krvarenje izravnim pritiskom.

Ranu prekriti sterilnom kompresom.

Imobilizirati prema potrebi.

Obvezno potražiti ili pozvati stručnu medicinsku pomoć.



DIJABETES

PREPOZNATI SIMPTOME NISKE VRIJEDNOSTI ŠEĆERA U KRVI!!!

SIMPTOMI NISKOG ŠEĆERA U KRVI (HIPOGLIKEMIJE)



DRHTAVICA



PREZNOJAVANJE



ANKSIOZNOST



VRTOGLAVICA



GLAD



UBRZAN PULS



POREMEĆAJ VIDA



UMOR
IZNEMOGLOST



GLAVOBOLJA



RAZDRAZLJIVOST



POSTUPAK PRVE POMOĆI KOD PADA ŠEĆERA U KRVİ:

- Pitati osobu boluje li od šećerne bolesti.
 - Ako je osoba pri svijesti, ponuditi joj slatki napitak ili obrok. (sok, glukozne bombone..)
 - Smjestiti osobu u udoban položaj do potpunog oporavka.
 - Ako se stanje osobe ne popravlja, pozvati hitnu medicinsku službu.
-
- Ako je osoba dijabetičar izmjeriti razinu šećera u krvi (senzor ili trakice).
 - Glukoza ispod 3,9mmol/l početak je hipoglikemije koju treba tretirati



POSTUPAK PRVE POMOĆI KOD PADA ŠEĆERA U KRVI: (1)

Ako glukoza naglo pada (<3,0mmol/L), a osoba nije u mogućnosti više ništa uzeti na usta (besvjesno stanje)

- Osobu postaviti u bočni položaj (<https://youtu.be/j5zEQwE5Qk8>)
- Ne davati ništa na usta (da ne bi aspirirala i ugušila se)
- Aplicirati **GLUKAGON** prema priloženoj uputi u kutijici u kojoj injekcija dolazi.

**GUBITAK SVIJESTI UZROKOVAN PRENISKOM RAZINOM ŠEĆERA U KRVI
NAZIVA SE DIJABETICKA KOMA I TO JE STANJE OPASNO PO
ŽIVOT DIJABETICARA.**



GLUKAGON


PRIPREMA INJEKCIJE

Ukloniti plastičnu kapicu s bočice i štrcaljke (šprice) i ubrizgati svu tekućinu iz štrcaljke u bočicu


Protresti bočicu zajedno sa štrcaljkom da se prah otopi u tekućini, mućkati dok se otopina ne razbistri

Povući u štrcaljku sadržaj bočice

Okrenuti štrcaljku iglom prema gore, lupiti je lagano prstom da mjehurići zraka dođu na vrh te pritiskom na štrcaljku istisnuti zrak



GLUKAGON (1)



DOZIRANJE

- 1. Za dijete lakše od 25 kg potrebno je injektirati pola doze
- 2. Za dijete teže od 25 kg i odrasle potrebno je injektirati cijelu dozu

Doza se uštrcava ispod kože ili u mišić, najbolje u bedreni mišić i to okomito na kožu.

SIMPTOMI I ZNAKOVI NAPADAJA ASTME:

Otežano disanje

Šumni izdisaji

Kašalj

Govorne tegobe
u smislu kratkih
rečenica i
šaptaja

Sivoplave usne,
uške i vrhovi
prstiju

Nelagoda i
tjeskoba

Iscrpljenost
nakon napadaja

Prestanak
disanja i gubitak
svijesti



POSTUPAK PRVE POMOĆI KOD NAPADAJA ASTME.

Smirivati osobu, savjetovati joj da miruje i ne napreže se.

Postaviti osobu u udoban sjedeći položaj.

Otpustiti pritisak tjesno pripojene odjeće.

Pobrinuti se da osoba ima dovoljno svježeg zraka.

Ako osoba ima svoje lijekove (inhalator), pomoći joj da ih primjeni, no kontrolirati primjenu da se osoba ne predozira.

Ako se stanje ne popravlja ili ako se pogoršava, pozvati hitnu medicinsku službu.





ŠTO ČINITI ?

- Ostatи kraj osobe
- Mjeriti vrijeme napada- ukoliko traje duže od 5 min pozvati hitnu medicinsku pomoć
- Zaštititi od ozljeda- posebno glave
- Postaviti osobu u bočni položaj
- Pratiti i nadzirati disanje



ŠTO NE ČINITI ?

- Ne stavljati ništa osobi u usta
- Ne obuzdavati osobu
- Ne pomicati osobu osim ako je u opasnosti



Univerzalni znak
za gušenje

GUŠENJE STRANIM TIJELOM

- Klasični znakovi – osoba ne može **pričati, kašljati, disati**
- Ne može komunicirati, strah





POSTUPAK PRVE POMOĆI KOD GUŠENJA

Gušenje odrasle osobe:

https://youtu.be/zQ_Lh16kqMk

Gušenje dojenčeta:

<https://youtu.be/jVxigmjdREM>



KAKO PREPOZNATI MOŽDANI UDAR?

- **Oduzetost lica**

Obješen rub usana?

Recite osobi da se nasmije i/ili isplazi jezik. Osoba ne može podići oba kuta usana, a jezik je iskrivljen i bježi na jednu stranu

- **Utrnulost dijela tijela**

Jedna ruka pada?

Recite osobi da podigne ruke.
Ruka je slaba i „pada”

- **Poremećaj govora**

Konfuzan i nerazumljiv?

Recite osobi da kaže nešto. Govor čudan i nerazumljiv, a osoba samo ponavlja riječi ili fraze



POSTUPAK PRVE POMOĆI KOD MOŽDANOG UDARA:

Pozvati hitnu medicinsku pomoć

Osobu postaviti u udoban ležeći položaj s podignutim ramenima i glavom.

Otpustiti pritisak tjesno pripojene odjeće i osigurati dovoljno svježeg zraka.

Osobi ne davati ništa na usta jer će možda teže gutati.

Ako osoba izgubi svijest i prestane normalno disati, treba što prije započeti oživljavanje.



SIMPTOMI SRČANOG UDARA:

Tjeskoba

Bol u prsima

Bol u lijevoj
ruci

Brzi i
nepravilan
puls

Znojenje

Zamagljenje
vida

Umor

Mučnina

Gubitak
apetita

Slabost



POSTUPAK PRVE POMOĆI KOD SRČANOG UDARA:



Pozvati hitnu medicinsku službu.

Unesrećenu osobu postaviti u udoban polusjedeći položaj (naslonjena glava i ramena, a koljena savijena) i savjetovati joj da miruje.

Otpustiti pritisak tjesno pripojene odjeće i osigurati dovoljno svježeg zraka.

Ako osoba izgubi svijest i prestane normalno disati, potrebno je što prije započeti oživljavanje.



OSNOVNO ODRŽAVANJE ŽIVOTA (BLS)

- https://youtu.be/UMc_AfP-LHM
- <https://youtu.be/j5zEQwE5Qk8>

